

بسمه تعالی
بیمارستان شهداء بناب

اطلاعات لازم در مورد دوران قبل و حین بارداری

تهیه و تنظیم:

معصومه رضائی

کارشناس پرستاری (سوپروایزر آموزش سلامت)

رعنا اسحاقی

کارشناس مامایی (ماما LDR)

منبع:

ویلیامز

تهیه: خرداد ۱۳۹۹

بازنگری: فروردین ۱۴۰۲



حتمالاً از بارداری

با مشورت پزشک

اسید فولیک و آهن

مصرف کنید

مراقبت های پیش از بارداری نیز همانند مراقبت های دوران بارداری، در کلیه مراکز بهداشتی درمانی توسط پزشکان و ماماها مرکز انجام می گیرد.

وزن گیری در بارداری:

وزن گیری پیوسته و آهسته نشانه یک حاملگی نرمال و سالم است. تمامی زنان باردار برحسب شرایط بدنی میزان افزایش وزن مورد نیاز متفاوتی دارند که براساس شاخص جرم بدن قبل از بارداری محاسبه می شود.

علائم خطر:

به محض مشاهده هر کدام از علائم خطر زیر هر چه سریعتر باید به بیمارستان مراجعه نماید:

* لکه بینی، خونریزی یا آبریزش از ناحیه تناسلی

* احساس کاهش یا نداشتن حرکت جنین

* درد شکم و پهلوها

* تب و لرز

* افزایش ناگهانی وزن

* ورم بدن بخصوص در دستها و صورت

* افزایش فشارخون مساوی یا بالاتر از ۹۰/۱۴۰

* تهوع و استفراغ مداوم و شدید و یا خونی

* تنگی نفس، درد قفسه سینه، طپش قلب در

فعالیت های معمول

مراقبت های پیش از بارداری

دوران پیش از بارداری ، دوران مهم و خاموش در سلامت مادر و نوزاد است چرا که منشا بسیاری از بیماریهای دوران بارداری به زمان قبل از بارداری مربوط می شود. در مراقبت پیش از بارداری تاثیر بیماری مادر برنوزاد ، همچنین اثر حاملگی بر سلامت مادر بررسی می شود . انجام مراقبت پیش از بارداری و بررسی سلامت مادر موجب می شود حاملگی در شرایط مناسبی آغاز شده و خطراتی که موجب بورز عوارض نا مطلوب حاملگی می شوند قبل از دوران بارداری اصلاح گردند تا مشکلات آینده برای سلامتی مادر و نوزاد کاهش یابند.

اصول مراقبت پیش از بارداری

* معاینه بالینی : شامل اندازه گیری قد ،وزن ،کنترل فشار خون ، معاینه دهان و دندان، چشم ، تیروئید ،قلب ، ریه، پوست، شکم ، اندام ها و دستگاه تناسلی.
* آزمایش ها و سونوگرافی شامل آزمایش خون از نظر کم خونی ، تعیین گروه خون، دیابت ، آزمایش ادرار و پاپ اسمیر (تست سرطان دهانه رحم) و...وانجام سونوگرافی در صورت نیاز
* تجویز قرص اسید فولیک: توصیه به شروع مصرف آن به میزان روزانه یک عدد و حداقل سه ماه قبل از بارداری.
* ایمن سازی: در صورت نیاز به تزریق واکسن سرخچه و توام بزرگسال

مراقبت های دوران بارداری

در طی بارداری بدن دچار تغییراتی می شود که یک خانم باردار با بکار گیری توصیه های زیر می تواند بارداری را با کمترین عوارض به پایان برساند.

رژیم غذایی

*آهن:

مصرف روزی یک عدد قرص فرس سولفات از هفته ۱۶ تا ۳ ماه پس از زایمان و توصیه به مصرف آن بعد از غذا و شب قبل از خواب.

*مولتی ویتامین:

از هفته ۱۶ تا سه ماه پس از زایمان مصرف یک عدد کپسول مولتی ویتامین ساده یا مینرال توصیه می شود.

اجابت مزاج

تغییرات گوارشی در بارداری یبوست ایجاد میکند. مصرف آب و مایعات کافی ، میوه و سبزیجات در برطرف کردن یبوست کمک کننده هستند.

خواب و استراحت

۸-۹ ساعت خواب در شب مورد نیاز است که موجب کاهش حساسیت و زود رنجی و افسردگی و خستگی پذیری می شود.(در ماه های آخر استراحت به پهلوی چپ توصیه می شود).

ورزش

بهترین ورزش پیاده روی در هوای آزاد است. از ورزشهایی که خطر صدمه زدن و یا افزایش ضربان قلب وجود دارد باید خود داری شود.

مسافرت

مسافرت در زنان باردار تا هفته ۳۶ محدودیتی ندارد مگر اینکه به علت شرایط خاص مثل سابقه سقط و زایمان زودرس ، بارداری چند قلوبی و خونریزی توسط پزشک منع شده باشد. در دوران بارداری بهتر است هر دو ساعت از ماشین پیاده شده و ۱۵ الی ۳۰ دقیقه پیاده روی کنند و بهتر است بعد از ۳۶ هفته تا حد امکان از مسافرت پرهیز کرده و سوار هواپیما نیز نشود.

نشستن طولانی مدت

باعث افزایش احتمال ترومبوفلیت می شود بنابراین توصیه می شود هر ۲-۱ ساعت بمدت ده دقیقه راه برود.

داروها

در دوران بارداری از مصرف هر دارویی بدون تجویز پزشک باید خود داری شود حتی مصرف داروهای گیاهی نیز باید با نظر پزشک مصرف شود.

دهان و دندان

بعلت مصرف بیشتر مواد غذایی ترش یا شیرین ، تهوع و استفراغ ، کم حوصله بودن و خوب مسواک نزدن محیط دهان مستعد رشد باکتری ها و پوسیدگی دندان و بیماری لثه می شود . از نخ دندان و مسواک پس از هر وعده غذایی استفاده شود.